19

N° 7.

PRINTEMPS, ÉTÉ ET AUTOMNE 1852.

PRIX-COURANT

DE J. LINDEN,

HORTICULTEUR A BRUXELLES.

PLANTES NOUVELLES

DIRECTEMENT INTRODUITES PAR L'ÉTABLISSEMENT, LIVRABLES DEPUIS L'AUTOMNE 1851 ET DISPONIBLES A DES PRIX TRÈS-RÉDUITS.

ALLOPLECTUS SCHLIMMII.

La plus belle espèce du genre. Feuilles grandes d'un vert obscur, admirablement veloutées en-dessus, d'une belle couleur lie de vin en-dessous; calice rouge velouté, corolle velue d'un pourpre violet. Originaire des parties chaudes du Socorro. 10 francs.

APHELANDRA GRANDIS, Klotzsch.

Grande et belle plante à feuilles ovales acuminées de 8 à 10 pouces de longueur sur 6 de largeur; épis terminal, ramifié, d'un pied et au delà de longueur, fleurs nombreuses d'un rouge vermillon très-vif 5 francs.

CENTROPOGON SPECIOSUS, Planchon.

Très-jolie espèce à grandes feuilles d'un vert satiné à la partie supérieure et d'un rouge ponceau en-dessous; corolle de 2 pouces de longueur, écarlate, d'un orange vif à l'extrémité. 10 francs.

CENTROSELENIA (NAUTYLOCALYX) BRACTEATA, Planchon.

Plante très-remarquable à grandes feuilles pubescentes d'un vert glauque; fleurs grandes d'un blanc pur, sortant du milieu de deux enveloppes florales d'un violet pâle. Introduite du Socorro en 1850 par M. L. Schlim. 10 francs.

COLUMNEA AURANTIACA, Décaisne.

Cette jolie espèce est figurée dans la Flore des Serres juin 1850. 5 francs.

COLLECTIONS SPÉCIALES :

Mon établissement de Luxembourg a fait paraître un catalogue spécial pour la généralité des plantes de serre tempérée et froide, pour les Azalées, Calcéolaires, Camellia, Chrysanthèmes, Cinéraires, Fuchsias, Geranium, Pensées, Rosiers, Rhododendrum, Verbenas, etc., etc., ainsi que pour les *graines de fleurs et de légumes*.

Ce catalogue sera adressé franco à toute personne qui en fera la demande par lettre affranchie.

ORCHIDÉES REMARQUABLES

Nouvellement introduites.

ANGULOA CLOWESII, var. aurantiaca.

Cette belle variété est originaire de la Nouvelle-Grenade et se fait remarquer par des fleurs d'un jaune orange très-brillant. 40 à 75 francs.

ANGULOA PURPUREA.

J'ai introduit cette splendide espèce en automne 1851 et plusieurs exemplaires ont fleuri au mois de février dernier. La fleur est très-grande, intérieurement d'un pourpre foncé, velouté, parfois légèrement maculé de jaune vif, labelle rose ponctué de carmin, pourpre à la partie supérieure, colonne blanche pointillée de carmin, gymnosthème jaune tendre; pétales et sépales extérieurement d'un beau jaune.

C'est la plus belle espèce du genre et je puis hardiment la recommander comme telle aux Orchidophiles. 50 à 100 francs.

CYCNOCHES BARBATUM, Lindl.

20 à 30 francs.

CYCNOCHES LINDLEYI, Lind.

50 à 75 francs.

CYCNOCHES PESCATOREI, Lindl.

50 à 75 francs.

Voir pour la description de ces trois espèces mon catalogue de l'année dernière.

EPIDENDRUM HASTILABIUM.

Cette jolie epiphyte est originaire de la province d'Ocaña (Nouvelle Grenade) où elle a été découverte en automne 1851. Elle porte un bel épis de 40 à 60 fleurs, à labelle hasté, blanc strié de carmin, sépales et pétales d'un jaune orange. 30 à 50 francs.

EPIDENDRUM LILACINUM.

Espèce terrestre à grande ombelle de fleurs lilas, très-odorantes. Introduite en 1850 de la Nouvelle Grenade. 30 à 50 francs.

EPIDENDRUM SCEPTRUM, Lindl.

La dénomination spécifique donnée à cette brillante espèce par le savant professeur Lindley est un sûr garant de son mérite supérieur. Elle surpasse en beauté toutes ses congénères et ses riches épis peuvent supporter la comparaison avec ceux des plus grâcieux Saccolabium. Ils ne portent pas moins de 60 à 80 fleurs, du parfum le plus suave, à pétales et sépales d'un jaune d'or ponctuée de carmin; labelle blanc pointillé de pourpre à la base et pourpre foncé à l'extrémité.

Découverte par moi en 1843, cette magnifique espèce vient d'être retrouvée par M. Schlim, qui m'en envoya des exemplaires vivants à la fin de l'année dernière. 50 à 100 francs.

ERIOPSIS BILOBA, Lindl.

(*Voir* la description dans mon catalogue précédent.)

25 à 50 francs.

GONGORA AUREA-PURPUREA.

Hampe de deux pieds de longueur; fleur d'un jaune d'or maculé de pourpre. Jolie espèce originaire de la Nouvelle-Grenade. 25 francs.

GONGORA VERTICILLATA.

Hampe de trois à quatre pieds de longueur; fleurs généralement verticillées par quatre, blanches ponctuées de rouge. Espèce très-remarquable, introduite du Socorro, en 1851. 25 à 40 francs.

HOULLETIA ODORATISSIMA.

30 à 50 »

HOULLETIA PICTA.

25 à 40 »

HUNTLEYA FIMBRIATA.

50 à 75 »

(*Voir* la description de ces trois espèces dans mon catalogue précédent.)

HUNTLEYA MARGINATA.

Très-jolie espèce terrestre de la Nouvelle-Grenade, à hampe uniflore de trois à quatre pouces de hauteur; fleurs grandes, odorantes, à pétales blancs, quelquefois couleur café au lait, labelle, très-grand, blanc rayé de violet au centre, marginé de violet pourpre. Cette plante figure dans mon catalogue de l'année dernière sous le nom de *Zygopetalum fragrans*. 40 à 75 francs.

MYANTHUS (CATASETUM) SANGUINEUS.

(*Voir* catalogue de 1851.) 20 à 40 »

MAXILLARIA LUTEO-ALBA. Lindl.

(*Voir* catalogue de 1851.) 20 à 30 »

MAXILLARIA VENUSTA.

Quoiqu'appartenant à ce genre, généralement peu remarquable, l'espèce en question n'en est pas moins une fort belle plante à très-grandes fleurs, de cinq à six pouces de diamètre, du blanc le plus pur et labelle jaune tendre. Elle est originaire de la Nouvelle-Grenade et a été introduite en 1851.

30 à 50 francs.

ODONTOGLOSSUM HASTILABIUM. Lindl.

50 à 100 »

ODONTOGLOSSUM NAEVIUM. Lindl.

100 »

ODONTOGLOSSUM PESCATOREI. Lind.

100 à 200 »

ODONTOGLOSSUM SCHLIMMII. Lind.

40 à 80 »

Ces quatre espèces sont magnifiques et appartiennent aux plus brillantes introductions des derniers temps. (*Voir* le catalogue de 1851.)

ONCIDIUM CANDELABRUM. Lind.

60 à 150 francs.

ONCIDIUM CUCULLATUM, Lindl.

Cette charmante espèce fleurit actuellement dans mes serres et fait l'admiration des visiteurs. Les fleurs en sont très-brillantes, à grand labelle d'un beau rose maculé de pourpre, pétales et sépales brûnâtres. Originaire du *Quindiu* et introduite en 1851. 50 à 80 francs.

PAPHINIA TIGRINA.

(*Voir* le catalogue de 1851.) 25 à 40 »

SCHLIMMIA JASMINODORA. Planch. et Lind.

Genre nouveau des plus curieux, à sépales inférieurs soudés ensemble et formant un sac ressemblant à ceux des *Cypripedium*. L'espèce en question porte une hampe inclinée de huit à dix pouces, garnie de dix à quinze fleurs d'un blanc pur, à odeur de jasmin fortement prononcée. Elle croît épiphyte et terrestre dans les forêts des versants tempérés de la province d'Ocana, où elle a été découverte par M. Schlim. 30 à 50 francs.

SOBRALIA DICHOTOMA, Ruiz et Pavon.

75 à 150 »

SOBRALIA RUCKERII, Lind.

108 à 200 »

SOBRALIA VIOLACEA. Lind.

50 à 75 »

UROPEDIUM LINDENII, Lindley.

200 »

(*Voy.*, pour ces 4 espèces le catalogue de 1852.)

Nota. Toutes les Orchidées qui précèdent ont été figurées et les dessins s'en trouvent à l'établissement ainsi que ceux d'un grand nombre d'espèces non consignées ici.

SERRE CHAUDE.

	fr.	c.
ABUTA TOXICARIA	»	»
Achimenes, 25 espèces et variétés nouvelles, chaque à .	»	75
Adenocalymna comosum. . .	2	»
— longeracemosum. . .	15	»
ADHATODA AENEA (Gendarussa).	5	«
Aechmea (v. *Bromeliacées*). .	»	»
Aegiphylla grandiflora. . .	5	»
Aeschynanthus Acklandii . .	3	»
— Boschianus.	»	75
— javanicus	2	»
— Lobbianus	»	75
— longiflorus(Lysionotus)	1	»
— miniatus	1	»
— Paxtonii.	1	»
— pulchellus.	2	»
— pulcher	1	»
— Roxburghii.	1	»
— speciosus	2	»
Aeschynanthus Teysmamii. .	2	»
AFZELIA DISCOLOR. . . .	15-25	»
Agalmyla staminea	2	»
Agatophyllum aromaticum. .	4	»
Agave filifera	15-50	»
— glauca	8	»
— stricta	10	»
Allamanda Aubletii	10	»
— cathartica.	2	»
— neriifolia	4	»
— Paraensis	4	»
— Schottii.	4	»
Alloplectus congestus . . .	2	»
— CINEREUS.	»	»
— GLABER	»	»
— SCHLIMMII	10	»
— speciosus	2	»
— — purpureus. . . .	3	»
— VELUTINUS . , . . .	»	»

	fr.	c.
Alstonia macrophylla	3	»
Amaryllis reticulata superba .	5	»
— Solandraeflora. . . .	10	»
— diverses espèces nouvelles.	»	»
AMHERSTIA NOBILIS.	»	»
AMORPHOPHALLUS GRANADENSIS .	10	»
Ancistrolobus carneus . . .	1	»
— pulchellus.	»	»
ANTIARIS TOXICARIA.	»	»
Anthurium acaule.	5	»
— CORDIFOLIUM.	»	»
— digitatum.	»	»
— Galeottianum.	2	»
— giganteum.	20	»
— Hookerii.	3	»
— podophyllum. . . .	»	»
Aphelandra cristata	1	»
— fulgens.	1	»
— GRANDIS.	10	»
— MACROPHYLLA	»	»
Aralia (v. *Araliacées*).		
Arctocalyx Endlicherianus.	10	»
Ardisia acuminata.	2	»
— paniculata.	8	»
— SPECIOSA.	25	»
Argyreia Choisyana. . . .	2	»
Aristolochia Ottonis. . . .	3	»
— picta	2	»
— sp. de Cuba.	»	»
Artocarpus imperialis . .	10-20	»
— incisa	35	»
— integrifolia.	5	»
Arum campanulatum (Amorphophallus).	3-5	»
Arundinaria glaucescens. . .	1	»
ATACCA CRISTATA	10	»
Barbacenia purpurea. . . .	2	»
— — Rogieri .	5	»
— squamata	2-6	»
Barringtonia racemosa (voy. *Stravadium insigne*).	15-25	»
— speciosa.	»	»
Begonia albo-coccinea. . .	1-3	»
— cinnabarina	3-5	»
— coccinea	1	»
— JANTII	10	»
— lucida	1	»
— macrophylla	2-3	»
— odoratissima	1	»
— platanifolia.	2	»
— PUTZEYSII	2-10	»
— ramentacea	1	»
— stigmosa	1	»
— tomentosa.	5	»
— vitifolia	3	»
Belangera speciosa	6	»
BERTHOLLETIA EXCELSA . . .	30	»
Bertolonia maculata (Eriocnema aenea).	2-6	»
Besleria ardens	2	»
— campanulata	2	»

	fr.	c.
Besleria guyanensis	2	»
— URTICAEFOLIA	»	»
— WAGENERIANA	»	»
BIGNONIA FERRUGINEA (Anemopaegma), arbrisseau non grimpant à grandes panicules de fleurs d'un orange vif		
— marmorata.	3	»
— mollissima	3	»
— species du Cuba . . .	5	»
Billbergia (v. *Bromeliacées*). .	»	»
Blighia sapida.	15	»
Bonplandia trifoliata. . . .	»	»
Bowditchia Caobano. . . .	10	»
BOMBAX CARTHAGINENSIS . . .	25	»
Bonapartea gracilis (Dasylirion)	15-50	»
Brexia chrysophylla. . .	15-25	»
— madagascarensis. . .	2	»
— serrata	5	»
Bromelia (v. *Bromeliacées*). .	»	»
Brownea Ariza	10-15	»
— erecta.	25-50	»
— grandiceps.	10	»
— latifolia.	15	»
— PRINCEPS.	50	»
— racemosa	5	»
Brugmansia floribunda. . .	1	»
— NOBILIS	»	»
BRUNELLIA FUNCKIANA. . . .	25	»
BUMELIA MONTANA	25-50	»
BUNCHOSIA MACROPHYLLA. . .	»	»
BYRSONIMA HYPARGYREA . . .	15	»
Caladium bicolor.	3	»
— — picturatum . . .	»	»
— discolor.	3	»
— haematostigma	5	»
— macrophyllum. . . .	5	»
— odoratissimum . . .	3	»
— pictum.	2	»
— violaceum.	2	»
— diverses espèces nouvelles	»	»
— de Colombie	»	»
Calliandra caracasana . . .	3	»
Calophyllum Calaba. . . .	8	»
Calycophyllum coccineum. .	25	»
Campylobotrys discolor. . .	2-5	»
Canna (v. *Serre froide*).		
Canella alba.	15	»
Capanea grandiflora. . . .	2	»
— tigrina	2	»
Capparis nodosa	3	»
Caraguata lingulata. . . .	5	»
Carapa guianensis. . . .	25-50	»
Carica nana.	5	»
Carolinea affinis	5	»
— alba.	5	»
— fastuosa.	5	»
— HUMILIS, espèce naine fleurissant à une hauteur de 2 pieds; fleurs magnifiques. . . .	40	»

	fr.	c
Caryophyllus aromaticus	»	»
Catesbaea Lindeniana (Portlandia grandiflora)	3	»
Cecropia palmata	5-15	»
— peltata	»	»
Centradenia floribunda	1	»
CENTROPOGON ANGUSTIFOLIUS	»	»
— CAMPYLOBOTRYS	»	»
— KERMESINUS	»	»
— SPECIOSUS	10	»
— VERBASCUM	»	»
Centroselenia bracteata (Nautylocalyx)	10	»
— glabra	2	»
Cephalotus follicularis	30	»
Ceratostemma cordifolia (Semiramisia Lindenii)	15-30	»
Cerbera fruticosa	2	»
— laurifolia	5	»
— Manghas	5	»
— Tanghin	2	»
CHAETOGASTRA LINDENIANA	»	»
— PURPUREA	»	»
— SPLENDENS	»	»
— strigosa	2	»
Charianthus coccineus	3-15	»
Chirita Moonii	2	»
— Walkerii	1	»
CHRYSOPHYLLUM ARGENTEUM	»	»
— SPECIOSUM (Vismia macrophylla)	25-50	»
Cinchona calisaya	2	»
— MACROPHYLLA	»	»
Cinnamomum aromaticum	5	»
Cissus velutina	1	»
Cleome violacea	5	»
— rosea	5	»
Clerodendrum Bethunianum	10	»
— capitatum	6	»
— echinatum	3	»
— fallax	5	»
— glaucum	1	»
— Kaempferii	5	»
— macrophyllum	5	»
— scandens	3	»
— sinuatum	1	50
— splendens	2	»
— volubile	1	»
Clusia Cupei	»	»
Coccoloba Chica	25	»
— DISCOLOR	»	»
— longifolia	25	»
— macrophylla	»	»
— pubescens	15	»
— SPECIOSA	»	»
Coccosypselum discolor	1	»
COLUMNEA AURANTIACA	3	»
— CUBENSIS	3	»
— crassifolia	1	»
— FULGENS	»	»
— NODOSA	»	»
— VILLOSA	»	»

	fr.	c
Combretum Afzelii	2	»
— argenteum	5	»
— ferrugineum	3	»
— macrophyllum	4	»
— Pinceanum	5	»
— purpureum	5	»
— Wrightianum	5	»
Congea azurea	4	»
Conoclinium ianthinum	3	»
Conradia floribunda (Rytidophyllum)	2	»
CONDAMINEA LONGIFOLIA	»	»
— MACROPHYLLA	»	»
Cordia nivea	1	»
Corysanthera atro-sanguinea	»	50
COUTARIA CAMPANILLA	»	»
— speciosa (Portlandia hexandra)	»	»
Crinum sp. de Venezuela	10	»
Croton (Codiaeum)	»	»
— pictum	2-10	»
— variegatum	4-10	»
Cryptolepis longiflora	5-25	»
Cumingia trimaculata	1	»
Cupania panduraefolia	5	»
— sp. nova	»	»
Curculigo recurvata	1	»
Curcuma Roscoeana	10	»
— rubricaulis	»	»
CYANELLA METALLICA	25	»
Cyrtanthera Ghiesbreghtii	1	»
Cyrtoceras acuminatum	5	»
— multiflorum	2	»
— reflexum	2	»
Dasylirion (Bonapartea)	»	»
— filiforme	15-30	»
— serratifolium	10	»
Dichorisandra discolor	10	»
Dillenia speciosa	10	»
Dionaea muscipula	4	»
Diospyros Ebenum	10	»
Dipladenia atropurpurea	3	»
— crassinoda	3	»
— nobilis	10	»
— splendens	10	»
— UROPHYLLA	10	»
DIPTERACANTHUS ALBIFLORUS	5	»
— spectabilis	2	»
Dracaena angustifolia (ficifolia)	3	»
— Draco	2	»
— brasiliensis	5	»
— NOBILIS	50	»
— umbraculifera	10	»
Dracontium pertusum	1	»
Duranta Baumgardii	1	»
DURIO ZIBETHINUS	»	»
Dyckia ramosa	»	»
— remotiflora	1	»
Echites nutans	2	»
Eperua falcata	25	»
Epiphyllum Schlimmii	3	»

	fr.	c.
Eriocnema aenea (Bertolonia maculata)	2	»
— marmorea	10	»
Erythrina macrophylla	3	»
— species de Colombie	5	»
Erythrochiton brasiliensis	5-10	»
— macrophylla	10	»
EUCHARIS CANDIDA, charmante Amaryllidée nouvelle de la Nouvelle-Grenade, à fleurs en ombelle, d'un blanc de neige	20	»
Eugenia caryophyllata	10	»
— MALACCENSIS	10	»
— Sinaro	10-25	»
— triternata	10	»
Euphorbia atropurpurea	5	»
— pulcherrima (Poinsettia)	1	»
Euphoria Longan	10	»
Exostemma hirsuta (Oxyanthus)	1	»
— macrophylla	15-25	»
Fagraea obovata	6	»
FEVILLEA JAVILLA (Nhandiroba)	25	»
Feuillaea pedata	15	»
Ficus barbata	5	»
— Campanero	5	»
— elastica	2	»
— LUCIDA	10	»
— macrophylla (Artocarpus imperialis)	5-25	»
— religiosa	5	»
Franciscea acuminata	2	»
— confertiflora	5	»
— eximia	5	»
— hydrangaeformis	2	»
— latifolia	2	»
— ramosissima (augusta)	5	»
Galactodendron utile	»	»
Galipea odoratissima	10	»
Garcinia Mangostana	25	»
Gardenia africana	15	»
— Devoniana	15	»
— longistylis	5	»
— Pinceana	6	»
— Rothmannii	5	»
— Sherbourniae	2	»
— Stanleyana	2-10	»
— Whitfieldii	5	»
Gastonia (Gilibertia)	»	»
— dentata	10	»
— palmata	10	»
Genipa americana	10	»
— Caruto	10	»
Gesneria barbata	5	»
— Leopoldii	10	»
— Lindeniana	5	»
— picta	2	»
— rupestris	5	»
— Seemannii	5	»
— zebrina splendens	2	»
GEOFFROYA BREDEMEYERI	»	»

	fr.	c.
GLICOSMIS AURANTIACA	»	»
Glycine à fleurs roses de Ceylan	2	»
GODOYA SPLENDIDA	»	»
Goethia cauliflora	5	»
GRIAS CAULIFLORA	25	»
Grischowia hirta	»	»
Grislea purpurea	2	»
Guayacum sanctum	4	»
Guzmannia (v. *Broméliacées*)	»	»
Hamelia species de Colombie	5	»
Haemodictyon venosum (Echites nutans)	2	»
Hebeclinium ianthinum	5	»
HEDYOSMUM MACROPHYLLUM	»	»
Heinsia jasminiflora	5	»
Heintzia tigrina	2	»
Heliconia pumila	10	»
Heritiera Fomes	10	»
— macrophylla	5-50	»
HETEROPTERIS AUREO-NITENS	»	»
Higginsia discolor (Campylobotrys)	2	»
Hillia longiflora	2	»
— prasiantha	2	»
Hoya bella	5	»
— Bidwilliana	5	»
— campanulata	2-4	»
— cinnamomifolia	3	»
— crassifolia	6	»
— imperialis	4-8	»
— lacunosa	2	»
— macrophylla	5	»
— mollis	1-4	»
— Paxtonii	2	»
— picta	12	»
Hymenaea courbaril	10	»
Inga Saman	5	»
ISERTIA COCCINEA (Guettarda)	25	»
IPOMAEA LIMBATA (Pharbitis)	3	»
Ixora acuminata	»	»
— coccinea	2-5	»
— cuneifolia	5	»
— Griffithii	10	»
— incarnata	5-10	»
— javanica	5-10	»
— odorata (longifolia, Brionis)	5-10	»
— salicifolia	5-10	»
Jacaranda Clausseniana	25	»
— mimosaefolia	5	»
— TOMENTOSA, espèce nouvelle de Colombie à fleurs d'un bleu d'azur	»	»
JAMBOSA MALACCENSIS	»	»
Jatropha panduraefolia	5	»
— podagrica	15	»
Jonesia Asoca	20	»
LAFOENSIA PUNICAEFOLIA	25	»
Lagetta lintearia	5-25	»
Lapageria rosea	50	»
Laplacea (Euria)	»	»

	fr.	c.
Laplacea pubescens	15	»
— setosa	15	»
Laurus Canella	2	»
— Cinnamomum	5	»
— Persea	6	»
— SALICIFOLIUS	25	»
Leea lucida (Aralia excelsa)	5	»
Liebigia speciosa (Tromsdorffia)	2	»
LISIANTHUS CANDIDUS	»	»
— daturoides	»	»
— MACROPHYLLUS	»	»
— PRINCEPS	»	»
— Russelianus	5	»
Lubea caracasana	10	»
Magnolia (Talauma)	»	»
— fragrantissima	25	»
— mutabilis	»	»
— odoratissima (T. Candollei)	»	»
— Plumieri	25	»
— pumila	6	»
Mammilaria sp. nova de la Nouvelle-Grenade	15	»
Manettia sp. nova	»	»
Mammea americana	10	»
Mangifera indica	10	»
Manglietia glauca	10	»
Maranta albo-lineata	4-10	»
— eximia	10	»
— glumacea	6	»
— roseo-lineata	10	»
— rotundifolia	10-25	»
— sanguinea	6	»
— variegata	10	»
— vittata	25	»
— sp. de Cayenne	10	»
— sp. de la Nouvelle-Grenade	»	»
MARCETTIA ANDICOLA	5	»
MATISIA CORDATA	»	»
MEDINILLA MAGNIFICA	20-40	»
— speciosa	2	»
— — la douzaine	15	»
MELIOSMA SPECIOSA	»	»
MENDOZIA RHODOSTOMA	»	»
Meriania macrantha	10	»
MIKANIA CORYMBIFLORA	5	»
Michelia Champaca	10	»
Musa Cavendishii	5	»
— Dacca	10	»
— discolor	10	»
— zebrina	30	»
Myristicha moschata	30	»
MYRTUS LINEARIFOLIUS	»	»
— myrsinoides	3-25	»
— Pimenta	5	»
— tomentosa	2	»
— VERTICILLATA	25	»
Napoleona imperialis	6-10	»
— Whitfieldii	15	»
NAUTYLOCALYX BRACTEATUS (Centroselenia)	10	»

	fr.	c.
Nepenthes ampullacea	50	»
— distillatoria	8	»
— laevis	25	»
— phyllamphora	25-50	»
— Rafflesiana	50-75	»
— sanguinea	»	»
Niphaea alba	»	»
— QUINQUEVULNERA	»	»
Oldfieldia africana	10-25	»
Oxyanthus hirsutus	1	»
Panax fructicosum	15-50	»
PALICOUREA AURANTIACA	»	»
— CYANEA	20	»
— macrostachya	5	»
Pancratium undulatum	5	»
Passiflora Briedeliaefolia	»	»
— Meridensis glauca)	15-50	»
— pubera	»	»
— retusa	»	»
— Schlimmiana	»	»
— diverses espèces nouvelles de Colombie	»	»
Pavetta borbonica	20-40	»
Pandanus inermis	10-25	»
— utilis	5-25	»
— javanicus variegatus	50	»
Parivoa grandiflora	»	»
Pentaraphia cubensis	2	»
Persea gratissima (Laurus)	6	»
Peperomia cordifolia	2	»
Pharus vittatus	6	»
Philodendron crassinerve	2	»
— crinipes	4	»
— digitatum	2	»
— Fontanesii	15	»
— giganteum	20	»
— lacerum	5	»
— pertusum	10-15	»
— pinnatifidum	15	»
Phrynium (v. *Maranta*)	»	»
Phyllartron Bojerianum	6-25	»
— comorense	6-25	»
Pincinecticia glauca	10	»
— stricta	10-25	»
— tuberculata	10-25	»
Piper Betel	5	»
— cordatum	5	»
— nigrum	5	»
— diverses espèces à	2	»
Pitcairnia (v. *Broméliacées*)	»	»
Pleroma elegans	2	»
PORTLANDIA CAMPANILLA	»	»
— hexandra	»	»
— grandiflora (Catesbaea Lindeniana)	5	»
— sp. nova	»	»
Posoqueria formosa	10	»
— longiflora	5	»
— platiphylla	15	»
Pourretia (v. *Broméliacées*)	»	»
PSIDIUM FERRUGINEUM	5	»
PSYCHOTRYA BRACTEATA	15	»

*

	fr.	c.
PSYCHOTRYA coerulescens . .	»	»
Puya (v. *Broméliacées*). . .	»	»
Pyrostria polymorpha (Pavetta borbonia).	20-40	»
Quassia amara.	15	»
Raphistemma pulchellum. .	3	»
Randia longiflora.	10	»
Ravenala (Urania).	»	»
— amazonica.	30	»
— madagascarensis. . .	25	»
Rheedia lateriflora	10	»
RHOPALA ARGENTEA.	»	»
— corcovadensis. . .	25-50	»
— COMPLICATA.	»	»
— elegans (montana).	10-20	»
— MACROPHYLLA	»	»
— MAIPURITO. . . .	30-100	»
— PAMPLONENSIS	50	»
— POLYSTACHYA . . .	25-100	»
— SPECIOSA.	»	»
— sp. nova.	»	»
Rogiera amoena	2	»
— discolor (Rondeletia). .	2	»
— elegans.	2	»
— Roezlii	3	»
— versicolor	10	»
Rondeletia discolor (Rogiera).	2	»
Roupellia grata (Strophanthus Stanleyanus.)	2	»
Rytidophyllum floribundum .	2	»
— speciosum	»	»
Salpingantha coccinea. . .	10	»
Saurauja macrophylla. . .	4-10	»
— spectabilis.	4	»
— villosa	4	»
— sp. nova.	»	»
Sciadophyllum longifolium. .	25	»
— pulchrum	10	»
Securidacca purpurea. . .	5-25	»
— violacea.	5-10	»
SIMABA CEDRON.	25	»

	fr.	c.
Siphocampylus (voyez *Serre froide*).	»	»
Solanum purpureum. . . .	3	»
Sophora secundiflora. . . .	»	»
Sorindeja madagascarensis. .	10	»
Spathodea campanulata. . .	5	»
— gigantea.	5	»
— speciosa.	10-25	»
Steriphoma aurantiaca. . .	5-10	»
Strophanthus (v. *Roupellia*).	»	»
STYLAGINELLA CRASSIPES. . .	»	»
Strychnos nux vomica	»	»
Taberneamontana dichotoma.	2	»
— longiflora	8	»
Tacca integrifolia (Atacca). .	10	»
Tacsonia (v. *Serre froide*). .	»	»
Talauma (v. *Magnolia*). . .	»	»
Thea Assamica.	5	»
Theobroma Cacao.	25	»
THEOPHRASTA GLAUCA.	30	»
— Jussieui.	10	»
— longifolia.	5-15	»
— MACROPHYLLA	55	»
— MINOR.	30	»
— OCANENSIS	30	»
Thibaudia (v. *Ericacées*, etc.).	»	»
Tillandsia (v. *Bromeliacées*). .	»	»
TRIPLARIS CORDIFOLIA. . . .	»	»
Tromsdorffia speciosa (Liebigia).	2	»
THYRSACANTHUS RUTILANS. . .	»	»
Urania (v. *Ravenala*). . . .	»	»
Vigandia Caracasana. . . .	5	»
Vismia Lindeniana	25	»
Vriesea (v. *Bromeliacées*) . .	»	»
Weinmannia (v. *Serre froide*, etc.)	»	»
Withfieldia lateritia. . . .	2	»
Xanthochymus ovalifolius. .	10	»
— pictorius	5	»
Zamia (v. *Cycadées*). . . .	»	»

FOUGÈRES.

Les espèces précédées d'un *t* sont de serre tempérée.

	fr.	c.
Acrostichum alcicorne (Platycerium). . . .	2-10	»
— crassinerve.	2	»
— ferrugineum.	10	»
t. — FRIGIDUM.	10	»
— grande (Platycerium)	50	»
— inaequale (aureum).	5-10	»
t. — villosum.	10	»
Adiantum affine.	5	»
— concinnum.	2	»
— formosum	4	»
— hispidulum.	3	»

	fr.	c.
— lunulatum	3	»
— macrophyllum. . . .	5	»
— trapeziforme	3	»
Allantodia umbrosa . . .	2	»
t. Aspidium macrophyllum. .	2	»
— proliferum	5	»
— pubescens	2	»
— trifoliatum.	2	»
— uliginosum.	1	»
Asplenium cicutarium. . .	5	»
— diversifolium . . .	5	»
— flaccidum.	5	»

	fr.	c.
Asplenium lucidum	5	»
Blechnum brasiliense. . . .	2	»
t — gracile	2	»
t. — lanceolatum.	1	»
t. — occidentale.	»	50
Callipteris sylvatica	»	»
Cassibura farinosa.	»	»
t. Coenopteris foenicula. . .	10	»
t. — vivipara.	5	»
t. Cheilanthes lentigera. . .	3	»
t. — speciosa.	10	»
t. — tomentosa	2	»
t. Cibotium Baromez . . .	3	»
Davallia divergens.	4	»
— solida.	5	»
Dicksonia Lindenii.	»	«
t. — tenera.	3	»
— rubiginosa	2	»
Diplazium celtidifolium. . .	5	»
— giganteum	10	»
— pubescens	3	»
— striatum.	2-4	»
Doryopteris sagittaefolia. .	»	»
t. Doodia lunulata.	5	»
t. — rupestris.	»	»
Fagdenia prolifera.	5	»
Gonophlebium subauriculatum.	»	»
Gymnogramma calomelanos.	1	»
— chrysophylla	1-3	»
— pulchella.	5	»
Gymnogramma sulphurea. .	2	»
t. Hemionitis palmata. . . .	5	»
t. Hypolepis spectabilis. . .	2	»
t. Lomaria nuda	8	»
t. — Patersonii	3	»
t. Lygodium hastatum	2	»
— polymorphum. .	5-10	»
Marattia elegans	30	»
— macrophylla. . .	15-25	»
— microphylla. . . .	20	»
Meniscium palustre	2	»
t. Nephrolepis exaltatum . .	1	»
t. Notochlaena laevis	3	»
Platycerium alcicorne. .	2-10	»
— grande	50	»
— Stemaria.	»	»
Pleiopeltis nuda.	2	»
Polypodium aureum. . .	1-3	»
— effusum.	5	»
— et diverses esp. nouvelles.	5	»
Pteris arguta.	1	»
— aurita.	2	»
— geraniifolia.	2	»
— hastata	2	»
t. — paleacea.	3	»
— scandens.	10	»
— umbrosa.	3	»
— verticillata.	2	»
Todea africana.	»	»

FOUGÈRES EN ARBRE.

	fr.	c.
Alsophylla cubensis.	25	»
— nitida.	25	»
— villosa	100	»
Blechnum brasiliense . .	10-50	»
Cyathea excelsa, très-beau. .	600	»
Hemitelia integrifolia. .	100-200	»
— obtusa	80-100	»
— speciosa.	100-300	»

LYCOPODIACÉES.

	fr.	c.
Lycopodium apodum (Selaginella).	»	50
— apus.	»	50
— caesium.	»	50
— — arboreum. . . .	2-3	»
— circinale	1	»
— cordifolium	2	»
— cuspidatum.	2	»
— denticulatum.	»	50
Lycopodium Galeottianum (Schottii).	1	»
— helveticum.	2	»
— increscentifolium. . .	1	»
— lepidophyllum . . .	10	»
— rigidum.	5	»
— umbrosum.	3	»
— viticulosum.	1-3	»
— Wildenowii	2-5	»

ORCHIDÉES.

—

	fr.	c.
Acanthophippium bicolor	6-12	»
— javanicum	25	»
Acineta (Peristeria).		
— Barkerii	10	»
— gigas	30-40	»
— Humboldtii	5-15	»
— longiscapa	10-20	»
Acropera Loddigesii	2-6	»
— — fuscata	3	»
— — pallida	2-5	»
— luteola (concolor)	5	»
Aerides affine	50-100	»
— crispum (Brookii)	50	»
— odoratum (cornutum)	30-60	»
— — majus	40-75	»
Aganisia pulchella	25	»
Angraecum ashatense	25	»
— APICULATUM	20-30	»
— bilobum	35-50	»
— clandestinum	40	»
— conopseum	15-30	»
— distichum	4	»
— subulatum	10	»
— teretifolium	10	»
Anaectochilus setaceus	50	»
— striatus	100	»
— xanthophyllus	50	»
Anguloa Clowesii	25-40	»
— — VAR. AURANTIACA	50-60	»
— PURPUREA	50-100	»
— Ruckerii	30-50	»
— uniflora	35-50	»
— VIRGINALIS	»	»
ANSELLIA AFRICANA	75-100	»
Arpophyllun giganteum	»	»
— squarrosum	30	»
Aspasia epidendroides (Miltonia)	4-10	»
— lunata (M. odorata)	6-12	»
Barkeria Skinneri	»	»
— spectabilis	30	»
Batemannia Colleyi	6-10	»
Bifrenaria atro-purpurea	5-10	»
— aurantiaca	6-10	»
— aureo-fulva	3	»
— racemosa	5	»
— sulphurea	3	»
— vitellina	6-12	»
Bletia campanulata	15-25	»
— sp. de Hayti	10	»
— sp. de la Nouv. Grenade	5	»
Bolbophyllum barbigerum	4	»
— Careyanum	1	»
— Henschallii	15	»
— saltatorium	5	»
Brassavola cordata	»	»
— DIGBYANA	75-100	»
— glauca	6-12	»
— FILIFOLIA	15	»
— Parkinsoniana	10	»
— Perrinii	4-10	»
— SCHLIMMII	15	»
— venosa	5	»
Brassia brachiata	15-25	»
— caudata	6	»
— CINNABARINA	50	»
— crucifera	12	»
— cuspidata	10	»
— GLUMACEA	15	»
— guttata	15-25	»
— Henschmannii	15	»
— Lanceana	5-10	»
— Lawrenceana	6-12	»
— macrostachya	12	»
— maculata	4-12	»
— — major	6-15	»
— OCANENSIS	25-40	»
— verrucosa	15-20	»
— Wrayi	15-25	»
Broughtonia sanguinea	15	»
— lilacina	25	»
Burlingtonia candida	»	»
— fragrans	25	»
— GRANADENSIS	20-40	»
— rigida	12-20	»
— venusta	20-40	»
Calanthe bicolor	5	»
— CURCULIGOIDES	35-50	»
— densiflora	4-12	»
— MASUCA	40	»
— veratrifolia	10	»
— VESTITA	30	»
Camaridium ochroleucum	6	»
Camarotis purpurea	25	»
Catasetum Hookerii	4-8	»
— maculatum	10	»
— naso	25	»
— recurvatum	10	»
— rostratum	10	»
— tridentatum	8	»
— sp. de Caracas	15	»
— sp. de Merida	15	»
— sp. de la Nouvelle-Grenade	15	»
Cattleya Acklandiae	50-100	»
— amethystina	25-40	»
— bicolor	»	»
— bulbosa	40	»
— candida	25	»
— citrina	»	»

	fr.	c.
Cattleya crispa	12-25	»
— — purpurea	»	»
— Forbesii	4-10	»
— granulosa	10	»
— guttata	30	»
— intermedia	»	»
— labiata	25-50	»
— Leopoldii	»	»
— Loddigesii	12-25	»
— maxima (Mossiæ)	8-20	»
— — albiflora	25	»
— Pinelii	30-50	»
— Skinneri	»	»
Chelonanthera speciosa (Coelogyne	40	»
Chysis aurea	30	»
— bractescens	30-40	»
Cirrhaea fusco-lutea	2	»
— gracilis	2-4	»
— Loddigesii	2-6	»
— picta	3-6	»
— rubro-purpurea	5-10	»
— Russeliana	3-6	»
— squalens	2-4	»
— tristis	4-8	»
— Warreana	3-6	»
Cirrhopetalum chinense	6	»
— Candelabrum	8	»
— Macraei	5	»
— Medusæ	8	»
— nutans	3	»
— picturatum	3	»
— Thouarsii	5	»
— vaginatum	4	»
Cœlia Baueriana	3	»
— macrostachya	6-10	»
Cœlogyne aspirata		
— cristata	15-30	»
— Cumingii	15-25	»
— fimbriata	3	»
— flaccida	20	»
— fuliginosa	4-6	»
— Gardneriana	40	»
— humilis (Pleione)		
— intermedia	20	»
— Lowii	»	»
— maculata (Pleione)	20	»
— ochracea	15-25	»
— speciosa	40	»
— trisaccata	30	»
— Wallichiana (Pleione)	25	»
COMPARETTIA FALCATA	25-40	»
— ROSEA	40	»
Coryanthes Albertinae	»	»
— macrantha	30	»
— maculata	30	»
— — eximia	20	»
— speciosa	25	»
Cycnoches BARBATUM	20-30	»
— chlorochilum	12-25	»
— LINDLEYI	30-80	»
— Loddigesii	25	»

	fr.	c.
Cycnoches maculatum	»	»
— PESCATOREI	30-80	»
— ventricosum	30	»
Cymbidium aloifolium	2-6	»
— bicolor	25	»
— elegans	12-25	»
— ensifolium	2	»
— giganteum	8-15	»
— iridifolium	8-15	»
— pendulum	15-25	»
— pubescens	8-15	»
— sinense	2-6	»
Cypripedium barbatum	5-20	»
— caudatum	»	»
— insigne	2-6	»
— JAVANICUM	35-50	»
— Lowii	»	»
— purpuratum	5-10	»
— SCHLIMMII	»	»
— venustum	2-4	»
Cyrtochilum bictoniense	25	»
— filipes	5	»
— floribundum (Odontoglossum constrictum)	5-12	»
— hastatum	5-15	»
— leucochilum	5-15	»
— maculatum	8-15	»
— stellatum (Miltonia)	5-10	»
Cyrtopodium bracteatum	15	»
— punctatum	15	»
— Wilmorei	10	»
Dendrobium aduncum	15	»
— aggregatum	8-12	»
— aureum	25	»
— brevifolium	5-10	»
— buxifolium(pulchellum	2-6	»
— calamiforme	6-10	»
— calceolaria	5-25	»
— Cambridgeanum	25	»
— chrysanthum	12-30	»
— cœrulescens	12-25	»
— cucullatum	5-10	»
— cupreum	6-15	»
— Dalhousieanum	75	»
— densiflorum	12-25	»
— DEVONIANUM	20-30	»
— FARMERI	40-60	»
— fimbriatum	4-12	»
— FORMOSUM	30-60	»
— Gibsonii	20-40	»
— Griffithii	50	»
— Henschallii	75-100	»
— Jenkinsii	6-12	»
— macranthum (macrophyllum)	40	»
— moniliforme	10-20	»
— moschatum	5-20	»
— nobile	5-25	»
— Paxtonii	25	»
— Pierardii (cucullatum)	5	»
— pulchellum (buxifolium)	2-6	»

	fr.	c.
Dendrobium pulchellum-purpureum.	5-12	»
— sanguinolentum	25-30	»
— speciosum	5-15	»
— sulcatum	20-30	»
— triadenium	25	»
— Wallichianum	»	»
Dendrochilum filiforme	10-25	»
Dicripta Baueri	2-4	»
— dubia	3-6	»
Dinema polybulbon	2	»
Epidendrum alatum	25	»
— aloifolium	10	»
— armeniacum	»	»
— aurantiacum	10-15	»
— bicornutum	20-30	»
— BLEPHARISTIS	30	»
— Boothianum	10	»
— cepiforme	10	»
— CERATISTES	»	»
— ciliare	5	»
— cinnabarinum	8	»
— cochleatum	2	»
— crassifolium	5	»
— cuspidatum	3	»
— fallax	»	»
— falcatum	10	»
— floribundum	8	»
— fragrans	5-10	»
— Harrisonianum	10	»
— HASTILABIUM	30 50	»
— Hermentianum	15-30	»
— lactiflorum	10	»
— LILACINUM	30-50	»
— LINDENII (non Lindenianum) fleurs orange	25	»
— macrochilum	10	»
— — NIGRO-ROSEUM	20-20	»
— — roseo-purpureum	15-25	»
— oncidioides	20	»
— Parkinsonianum (falcatum)	10	»
— pastoris	5	»
— phœniceum	20	»
— pterocarpum	5	»
— PURUM	15-25	»
— radiatum	4	»
— roseum	15	»
— SCEPTRUM	40-100	»
— selligerum	20	»
— Stamfordianum	12-25	»
— STENOPETALUM	20-30	»
— tigrinum	15	»
— — albiflorum	12-30	»
— variegatum	20	»
— verrucosum	30	»
— viscidum	8	»
— vitellinum		
Eria aurea	15	»
— densiflora	6	»

	fr.	c.
Eria ferruginea	5-10	»
— flava	2-4	»
— floribunda	2-4	»
— rosea	2-4	»
— stellata	3	»
— vestita	2	»
ERIOPSIS BILOBA	25-50	»
Fernandezia acuta	4-8	»
— crassifolia	15	»
— elegans	10	»
— longifolia	10	»
Galeandra Baueri	40	»
— Funckiana	50-75	»
Galeottia Beaumontii	15	»
Gomeza recurva	8	»
Gongora ALBO-PURPUREA	20-30	»
— atro-purpurea	4-8	»
— AUREO-PURPUREA	20-30	»
— Bufonia	10	»
— citrina	10	»
— Jenitchii	20	»
— leucochila	15	»
— maculata	8	»
— odoratissima	10-15	»
— Ruckerii	10	»
— truncata	15	»
— VERTICILLATA	25-30	»
— VELUTINA	25-30	»
Godyera discolor	2	»
Govenia fasciata	5-10	»
— Gardneriana	10	»
Grammatophyllum multiflorum	40-50	»
— speciosum	75	»
Grobya Amherstiae	15	»
Habenaria Lindeniana	»	»
Hartwegia purpurea	10	»
Houlletia Brocklehurstiana	25	»
— LANSBERGII	40	»
— ODORATISSIMA	30-50	»
— PICTA	25-40	»
— stapeliaeflora	25-40	»
Huntleya candida	»	«
— FIMBRIATA	50-75	»
— MARGINATA (Zygopetalum fragrans)	40-60	»
— meleagris	»	»
— radians (Warrea)	35	»
— violacea	15-30	»
— — splendens	80	»
Isochilus linearis	3-6	»
Lacaena bicolor	15-30	»
Laelia acuminata	15	»
— anceps	10-25	»
— — Barkeri	15-25	»
— autumnalis	15-25	»
— aurantiaca	15	»
— cinnabarina	15	»
— flava	20	»
— furfuracea	20	»
— grandiflora	15	»
— Lindenii	»	»

	fr.	c.
Laelia superbiens.	50-200	»
Leptotes bicolor.	5	»
Lycaste (Maxillaria).	»	»
— aromatica	4-10	»
— AURANTIACA.	15-25	»
— balsamea	10-20	»
— Barringtoniae	4-8	»
— cruenta.	6-12	»
— Deppei	4-10	»
— fulvescens.	15-25	»
— gigantea.	5-15	»
— Harrisoniae.	4-10	»
— macrophylla	5-10	»
— Skinneri.	12-25	»
— tetragona	5-10	»
— tyrianthina.	7-15	»
MASDEVALLIA CANDIDA. . . .	20-50	»
— POLYANTHA.	20	»
— tricuspidata.	15-20	»
— Wageneriana. . . .	10-15	»
Maxillaria albata.	25	»
— atro-rubens.	2	»
— aureo-fulva.	3	»
— chlorantha.	2-6	»
— crocea	2-6	»
— cucullata	3-6	»
— densa	2-6	»
— GRANDIFLORA.	25-40	»
— LEPTOSEPALA	10-15	»
— LONGISSIMA	»	»
— LUTEO-ALBA.	20-50	»
— nigrescens.	10-20	»
— ochroleuca.	4-8	»
— Parkerii.	5-10	»
— picta.	5-10	»
— stapelioides	3-8	»
— VENUSTA (à fleurs d'un blanc de neige, labelle jaune). . . .	35-50	»
— tenuifolia	5-10	»
— viridis	5-10	»
Megaclinium falcatum. . . .	2	»
Miltonia bicolor.	20-50	»
— candida.	20-40	»
— Clowesiana.	20-40	»
— epidendroides (Aspasia).	4-10	»
— Loddigesii.	35-50	»
— Moreliana	40-100	»
— PULCHELLA	40-60	»
— spectabilis.	15-50	»
— stellata (Cyrtochilum).	4-10	»
Monacanthus atratus (Catasetum)	50	»
Monomeria nitida.	15	»
Mormodes buccinator. . . .	10	»
— Cartonii.	15	»
— citrinum.	15	»
— speciosum.	25-50	»
Myanthus cernuus.	15	»
— cristatus.	10	»
— Lansbergii.	15-25	»

	fr.	c.
MYANTHUS SANGUINEUS. . .	20-40	»
— — var.	20-40	»
Nanodes discolor.	6	»
Neottia speciosa.	5-10	»
Notylia incurva.	1	»
Octomeria graminifolia. . .	2	»
Odontoglossum ANGUSTATUM. .	100	»
— Cervantesii.	15	»
— citrosmum.	10-25	»
— constrictum (Cyrtochilum floribundum). .	6-10	»
— densiflorum	20-50	»
— grande	10-20	»
— HALLII	100-200	»
— hastatum	10-15	»
— HASTILABIUM. . . .	50-100	»
— Insleayi.	15-50	»
— laeve.	15-50	»
— Lindleyi.	10-20	»
— NAEVIUM.	100-150	»
— nebulosum.	50	»
— ODORATUM.		
— PESCATOREI. . . .	100-200	»
— pulchellum.	5-10	»
— phyllochilum. . . .	50	»
— revolutum.	40-60	»
— Rossii	15-25	»
— SCHLIMMII.	40-80	»
Oncidium altissimum. . . .	4-15	»
— ampliatum.	8-15	»
— — majus	10-20	»
— Barkerii.	25-75	»
— Bauerii.	6	»
— bicolor.	15	»
— bifolium	50	»
— Bondeanum.	»	»
— CANDELABRUM	60-150	»
— carthaginense. . . .	5-15	»
— Cavendishianum. . .	10-25	»
— cebolleta (juncifolium).	5-10	»
— citrinum.	4-8	»
— crispum.	6-10	»
— CUCULLATUM.	50-80	»
— divaricatum.	8-15	»
— falcipetalum	30-50	»
— flexuosum	4-10	»
— Harrisonianum . . .	5-10	»
— incurvum	20-40	»
— Insleayi (Odontoglossum).	15-50	»
— juncifolium (Cebolleta).	5-10	»
— Lanceanum.	15-50	»
— — elegans.	»	»
— leucochilum (Cyrtochilum)	5-15	»
— Lindenii.		
— luridum.	8-15	»
— —guttatum (roseum)	15-50	»
— macropterum. . . .	6	»
— maidifolium. . . .	»	»

Die Preise sind in Francs gestellt; 5 F. 75 c. einen Pr. Thaler. Verpackungen und Versendungen erhalten alle mögliche Sorgfalt und geschehen auf Rechnung und Gefahr der Besteller, welche gebeten sind, den Aufträgen ihre genaue Adresse, so wie die Art nnd Weise auf welche sie die Versendungen zu erhalten wünschen, beizufügen. Besteller, mit welchen das Etablissement nicht in Verbindung steht, ersuche ich ihren Aufträgen eine sichere Anweisung beizufügen, oder die Weise anzugeben auf welche sie den Betrag zu entrichten begehren.

BRIEFE ERBETE ICH PORTOFREI.

Prices, in francs and centimes. 25 francs to a pound sterling.

Orders may be directed to

Messrs Betham and Blackith, Shipping agents,
Cox and Hammond's Quay's.

LONDON.

Adresse :

J. LINDEN,
Naturaliste-Horticulteur,

BRUXELLES.

Les prix sont cotés en francs. MM. les amateurs et horticulteurs sont priés d'indiquer avec soin leur adresse et la marche à suivre pour l'expédition de leurs commandes. Les emballages et frais d'expédition sont à charge de l'acheteur; en cas de perte éprouvée par suite de retards dans l'expédition, le destinataire ne pourra avoir recours que contre l'expéditeur, tous les soins étant donnés de ma part à l'emballage.

Je dispose, ou je fais suivre en remboursement, suivant le désir de mes commettants. Les personnes avec lesquelles je ne suis pas encore en relation, sont priées d'accompagner leur commande du montant, ou de m'indiquer le mode de payement qu'elles désirent adopter, faute de quoi je me permettrai de faire suivre en remboursement.

JE PRIE INSTAMMENT D'AFFRANCHIR.

Bruxelles, le 1er avril 1852.

J. LINDEN.